

乳化型快速不完全佐剂

产品信息：

- 规格：10ml
- 运输条件：蓝冰运输
- 储存条件：2-8℃避光保存 10 个月

适用范围：

特别适合单抗研发用小鼠的免疫以及兔子、山羊、豚鼠等多克隆抗血清的制备；
禁止用于人类或其它用途，超范围使用产生的法律后果需要自行承担。

使用方法：

实验表明最佳使用比例是 30-50%。30%乳化后最粘稠，越接近 50%粘性越低。因此建议夏季使用低浓度冬季使用高浓度乳化；这样既能得到很好的免疫效果也能减少注射时带来的阻力困难。

乳化建议 2 种方法去操作：

- 1、将佐剂先加入乳化管，然后加少部分抗原搅拌乳化而下后再加抗原继续乳化，直到抗原加完再乳化几分钟即可。
- 2、抗原和佐剂加入乳化管，稍等抗原会沉入底部和佐剂分层，用搅拌器自上而下慢慢搅拌佐剂入抗原层，慢慢下移这时会发现混合液很快乳白越来越粘，几分钟即可完成。

注意事项：

虽然本产品很稳定，但还是要尽可能避免阳光直射带来的危害；
另外抗原如果含有甘油或者尿素会降低乳化效率，甚至乳化失败；
为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

***本试剂仅供实验室研究使用**